Física Estatística

Introdução

Vitor Oguri

Departamento de Física Nuclear e Altas Energias (DFNAE)
Instituto de Física Armando Dias Tavares (IFADT)
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

16 de setembro de 2018

uerj,ogo

Sumário

- 1 Introdução
 - Sistemas macroscópicos
 - Abordagem estatística
 - Conceitos básicos
- 2 Elementos de Termodinâmica
 - Variáveis e equações de estado
 - Leis da Termodinâmica
 - Potencial químico
 - Gases ideais degenerados
- 3 Sugestões de leitura

Teorias para sistemas macroscópicos

- Termodinâmica: **descrição de sistemas em interação com a vizinhança, ou campos externos, a partir de relações (leis e equações de estado) entre poucos parâmetros macroscópicos (variáveis de estado)** – Joule, Carnot, Clapeyron, Mayer, Helmholtz, Kelvin, Clausius, Maxwell, Nernst, Duhem, Massieu, Planck, Gibbs.
- Teoria Cinética: **gases são constituídos por moléculas que só interagem durante pequenos períodos de colisões aleatórias (caos molecular)** – Boyle, Clausius, Maxwell, Boltzmann.
- Física Estatística: **variáveis de estado representam valores médios de grandezas que flutuam quando um sistema encontra-se em equilíbrio termodinâmico** – Clausius, Maxwell, Boltzmann, Planck, Gibbs, Einstein, Bose, Fermi, Dirac.

Abordagem estatística

- descrição probabilística condicionada às leis da Mecânica Clássica, do Eletromagnetismo ou da Mecânica Quântica
- determinação (previsão) dos valores dos parâmetros macroscópicos de um sistema, das equações de estados, e das próprias leis da Termodinâmica para processos reversíveis
- todo sistema macroscópico possui um grande número de níveis de energia, associados a um grande número de estados (muitos graus de liberdade)
- em situações de equilíbrio, a probabilidade de ocorrência de qualquer estado, praticamente, não depende do tempo
- as incertezas relativas associadas aos diversos parâmetros de um sistema em equilíbrio são tão pequenas, que as previsões são praticamente "exatas"

j,ogo

Conceitos básicos

- **Microestado:** coleção de variáveis dinâmicas (posição, *momentum*, *spin*, ...) associadas aos constituintes de um sistema, em um dado instante.
- **Macroestado:** coleção de parâmetros macroscópicos (pressão, volume, temperatura, ...) que correspondem a vários microestados.
- **Reversibilidade:** evolução de um sistema por uma sucessão de estados de equilíbrio (processos quase-estáticos com efeitos dissipativos praticamente desprezíveis).

Variáveis de estado

extensivas

{ número de partículas (N)
entropia (S)
volume (V)
magnetização ($\mathcal{M}$)
polarização ($\mathcal{P}$)
energia interna (U)

intensivas

{ potencial químico (μ)
temperatura (T)
pressão (P)
campo magnético (H)
campo elétrico (E)
densidade de energia (u)

propriedades

{ capacidade térmica (C)
calor específico (c)
susceptibilidade (χ)

Equações de estado

- equação de Clapeyron:

$$\left\{ \begin{array}{l} PV = nRT \quad n = \frac{N}{N_A} \quad R \simeq 8.315 \text{ J/mol.K} \simeq 1.986 \text{ cal/mol.}^\circ\text{C} \\ PV = NkT \quad k = \frac{R}{N_A} \simeq 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K} \end{array} \right.$$

- lei de Curie: $M = C \frac{\mathcal{H}}{T}$ (C – constante de Curie)

- lei de Stefan-Boltzmann: $u = aT^4$

- equação de Langevin: $P = Np\mathcal{L}(a)$

$$a = \frac{p\mathcal{E}}{kT} \quad \mathcal{L}(a) = \coth a - \frac{1}{a}$$

1ª lei da Termodinâmica

variação da energia interna (U) de um sistema

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{trabalho}(W) : \int P dV, \int B dM \\ \text{calor}(Q) : C \Delta T \text{ (não envolve qualquer tipo de trabalho} \\ \text{nem ganho ou perda de partículas)} \end{array} \right.$$

- a capacidade térmica (C) é uma medida da resistência à variação de temperatura ao receber ou ceder calor
- enquanto a energia interna (U) é uma variável de estado extensiva, o calor (Q) e o trabalho (W) são quantidades definidas apenas quando há a variação do estado de um sistema, ou seja, dependem dos processos envolvidos (isotérmicos, isométricos, isobáricos, adiabáticos, isentrópicos, . . .)

1ª lei da Termodinâmica

1ª lei da Termodinâmica (Helmholtz - 1847)

$$\Delta U = Q - W \implies \begin{cases} \Delta U = 0 \text{ (sistema isolado)} \\ \Delta U = -W_{\text{adiab.}} \text{ (processos adiabáticos)} \end{cases}$$

A energia interna de um sistema isolado é constante

2ª lei da Termodinâmica

Entropia e irreversibilidade

- a entropia (S) é a variável de estado que caracteriza a irreversibilidade dos fenômenos macroscópicos
- a variação da entropia de um sistema fechado ao receber ou ceder reversivelmente uma pequena quantidade de calor (Q) à temperatura T é dada por

$$\Delta S = \left. \frac{Q}{T} \right|_{\text{rev.}} \quad (\text{Clausius - 1854})$$

- do mesmo modo que a energia interna, a entropia é definida a menos de uma constante, ou seja, apenas variações de energia e entropia são determinadas pela Termodinâmica

2ª lei da Termodinâmica

- a variação de entropia de um sistema isolado devido a processos naturais nunca é negativa
- a entropia de um sistema isolado nunca decresce

$$\Delta S \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad S_{\text{final}} \geq S_{\text{inicial}}$$

- O equilíbrio de um sistema isolado é um estado de máxima entropia

1^a e 2^a leis da Termodinâmica

$$dU = TdS - dW$$

- como a entropia é uma variável de estado, pode-se calcular a variação de entropia de um sistema em qualquer processo (reversível ou irreversível), a partir de um processo reversível concebível que leve o sistema do estado inicial ao estado final, determinando-se a variação de energia interna e o trabalho para realizar tal processo

$$dS = \frac{1}{T}dU + \frac{P}{T}dV$$

Capacidade térmica e calor específico

Capacidade térmica

$$\left\{ \begin{array}{l} dQ_{\text{rev}} = dU + P dV = d(U + PV) - V dP = T dS \\ C_V = \left. \frac{dQ}{dT} \right|_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V > 0 \\ C_P = \left. \frac{dQ}{dT} \right|_P = \left. \frac{\partial}{\partial T} (U + PV) \right|_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P > 0 \end{array} \right.$$

Capacidade térmica e calor específico

Calores específicos

$$c = \frac{C}{m} \quad (\text{calor específico}) \quad c_m = \frac{C}{n} \quad (\text{calor específico molar})$$

calores específicos de alguns sólidos

Substância	c (cal/g °C)	μ (g/mol)	c_m (cal/mol °C)
Alumínio	0.215	27.0	5.81
Carbono	0.121	12.0	1.45
Cobre	0.0923	63.5	5.86
Chumbo	0.0305	207.0	6.31
Prata	0.0564	108.0	6.09
Tungstênio	0.0321	184.0	5.91

Variação do calor específico molar com a temperatura

Relação de Mayer

$$c_p - c_v = R$$

Relação entre os calores específicos molares de alguns gases

Gás	c_p (J/mol.K)	c_v (J/mol.K)	$c_p - c_v$ (J/mol.K)	$\gamma = c_p/c_v$
He	20.9	12.6	8.3	1.659
Ar	20.9	12.5	8.4	1.672
Hg	20.9	12.5	8.4	1.672
O ₂	29.3	20.9	8.4	1.402
CO	29.3	21.0	8.3	1.395
Cl ₂	34.1	25.1	9.0	1.359
SO ₂	40.6	31.4	9.2	1.293
C ₂ H ₆	51.9	43.1	8.8	1.204

ij,ogo

Potencial químico

$$dU = T dS - P dV + \sum_i \mu_i dN_i \quad \text{Gibbs (1875)}$$

N_i é o número de partículas do tipo i , e μ_i é o potencial químico associado, que representa a energia necessária para variar de uma unidade o número de partículas do tipo i .

A energia interna (U) de um sistema, para um processo reversível, é uma função monotonicamente crescente da entropia (S).

$$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_X = T > 0$$

X representa o volume (V), a magnetização ($\mathcal{M}$), a polarização ($\mathcal{P}$), o número de partículas (N) ou qualquer outra grandeza extensiva associada ao trabalho realizado pelo sistema sobre o meio externo.

- A 3ª lei, enunciada originalmente por W. Nernst, em 1906, só é evocada quando se necessita tabular valores absolutos da entropia, ou se trabalha em baixas temperaturas.
- Segundo Nernst, o fato do calor específico tender a zero com a temperatura, decorre da hipótese de que qualquer variação de entropia também tende a cessar quando a temperatura de um sistema se aproxima lentamente do zero absoluto.
- Desse modo, pode-se considerar que o valor da entropia a 0 K é uma constante arbitrária.
- De acordo com Planck, levando-se em conta o comportamento quântico dos sistemas essa constante tem valor nulo.

3ª lei da Termodinâmica

A entropia de qualquer sistema se anula quando sua temperatura se aproxima lentamente de 0 K.

Sugestões de leitura

- M. J. de Oliveira
Termodinâmica
Ed. Livraria da Física, 2ed., 2012.
- R. Bowley & M. Sanchez
Introductory Statistical Mechanics
Oxford University Press, 2ed., 2010.
- C. Kittel & H. Kroemer
Thermal Physics
Freeman and Company, 2ed., 1980.
- F. Mandl
Statistical Physics
Wiley, 2ed., 1988.